

El siguiente protocolo de manejo del dolor fue preparado para ser global y se consideraron no sólo las diferentes modalidades analgésicas, sino también el acceso a los distintos fármacos en todo el mundo. Su aplicación deberá ser guiada por las necesidades analgésicas específicas e individuales de cada paciente en particular. Este protocolo es reproducido del “*Tratado Global sobre el dolor de la WSAVA*”, el cual es una revisión resumida pero completa acerca del reconocimiento del dolor, de las distintas modalidades del mismo, y del tratamiento para los distintos escenarios de dolor en perros y gatos. El *Tratado Global sobre el dolor de la WSAVA* fue publicado en el *Journal of Small Animal Practice* y está disponible con acceso abierto en el sitio web www.wsava.org, incluido dentro del enlace correspondiente al Consejo global del dolor.

Nivel de dolor percibido asociado a variadas condiciones.

Dolor severo a intolerable.	
Infartos y tumores del sistema nervioso central	Pancreatitis necrotizante o colecistitis
Meningitis	Trombosis/ isquemia
Reparación de fracturas con un daño de tejidos blandos extenso	Cáncer óseo
Cirugía espinal	Osteodistrofia hipertrófica
Ablación del canal auditivo	Trombosis aórtica
Daño por quemaduras	Dolor neuropático (atrapamiento/ inflamación del nervio, hernia aguda discal)
Fracturas articulares o patológicas	Inflamación (extensa, <i>por ejemplo</i> , peritonitis, fasciculitis, celulitis <i>en especial por estreptococos</i>)
Amputación de miembros	

Dolor moderado a severo (varía con el grado de enfermedad o daño)	
Artritis inmunomediada	Daño, inflamación o patología de tejidos blandos en etapas iniciales o en resolución
Panosteitis	Enfermedad discal intervertebral
Dolor capsular por organomegalia	Torsiones mesentéricas, intestinales, gástrica y otras
Distensión de órgano hueco	Peritonitis con abdomen séptico
Hernia diafragmática por trauma	Mucositis
Pleuritis	Cáncer oral
Trauma (Ej., ortopédico, de cabeza, gran cantidad de tejidos blandos afectados)	Mastitis
Heridas causadas por congelamiento	Distocia
Obstrucción uretral, ureteral y/o biliar	Resección y reconstrucción amplia para quitar una masa o cirugía ortopédica correctiva (osteotomías, cirugía del ligamento cruzado; artrotomías abiertas)
Glaucoma	
Ulceración o abrasión corneal	
Uveítis	

Dolor moderado	
Daños en tejidos blandos (<i>menos graves que los anteriores</i>)	Artroscopia diagnóstica y laparoscopia
Obstrucción uretral	Cistitis
Ovariohisterectomía	Osteoartritis

Dolor leve a moderado	
Enfermedad dental	Drenaje torácico
Otitis	Punción de abscesos
Laceraciones superficiales	Castración de machos
Cistitis leve	

Información de Mathews, K (2000) *Vet Clin NA, Sm Anim Pract.* 30, 729-752.

Para información adicional sobre las dosis farmacológicas de las drogas, ver las tablas en el sitio web www.wsava.org (Tratado Global sobre el dolor de la WSAVA).

WSAVA quiere reconocer a los patrocinadores del Consejo Global del Dolor.

