



Apreciación global subjetiva

Actitud general

Comport. interactivo

Frec. cardiaca

Valor inicial:

**Reacción a la manipulación de la zona
quirúrgica**

Intensidad

de la reacción

TRATAMIENTO

EVALUACION CLINICA DEL DOLOR

Identificación :

Sin dolor

Dolor intolerable

Entre los signos siguientes :

- presenta modificaciones respiratorias
 - curva el lomo
 - permanece fijo en posición antiálgica
 - se agita, queja o permanece fijo al fondo de la caja
 - no se acicala
 - mira, mordisquea o lame la herida
 - se orina o defeca encima
 - pérdida del apetito
- Ningún signo presente
 - 1 solo presente
 - 2 a 4 presentes
 - 5 a 8 presentes

Está atento y responde a las caricias, a la voz

Responde tímidamente

No responde inmediatamente

No responde o responde de forma agresiva

~ 10 % aumento

11-30 % aumento

31-50 % aumento

> 50% aumento o no evaluable

Sin reacción visible o audible

- después 4 manipulaciones
- Reacción(s) visible(s) o audible(s)
- a la 4º manipulación
 - a la 2º y 3º manipulación
 - a la 1º manipulación o no evaluable

Ninguna respuesta

Responde tímidamente, intenta sustraerse

Desvía la cabeza o vocaliza

Intenta huir o agredir o no evaluable

1 a 5 : dolor ligero

6 a 10 : dolor moderado

11 a : dolor severo

18